

آیا ظرفیت پذیرش دانشجو در سال آینده کاهش می یابد؟

بهمن 10، 1403



کیا پرس/وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت پذیرش دانشجو رشته پزشکی در سال ۱۴۰۴ ثابت می ماند یا کاهش می یابد؟، گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو در سال آینده کاهش نمی یابد، قرار شد افزایش پیدا نکند، به عبارتی ظرفیت کاهشی نمی شود.

به گزارش کیا پرس، دکتر محمد رضا ظفرقندی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت دانشجویان رشته های پزشکی از سال بعد، افزایش ۲۰ درصدی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بنا است از سال بعد دیگر افزایش پذیرش دانشجو نداشته باشیم، گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امسال، سال آخر افزایش پذیرش دانشجو است.

ملا تونین: مکملی که بدون تجویز پزشک می تواند خطرناک باشد

بهمن 10، 1403



کیا پرس/سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو بر اهمیت مشورت با پزشک یا داروساز در هنگام مصرف مکمل‌ها تأکید کرد و نسبت به مصرف خودسرانه ملاتونین هشدار داد.

به گزارش کیا پرس از وبدا، دکتر نازیلا یوسفی در تعریف دارو و مکمل توضیح داد: «داروها برای درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها تجویز می‌شوند و معمولاً نیاز به نسخه پزشک دارند، در حالی که مکمل‌های غذایی برای تأمین مواد مغذی ضروری و حفظ سلامت عمومی بدن مصرف می‌شوند و اغلب بدون نسخه قابل تهیه هستند.

وی با بررسی جایگاه ملاتونین از نظر دسته بندی به عنوان مکمل یا دارو، گفت: «ملاتونین در برخی کشورها به عنوان مکمل فروخته می‌شود، اما در برخی از کشورهای اروپایی تنها با تجویز پزشک برای گروه‌های سنی خاص در دسترس است. در ایران، این فرآورده در دسته مکمل‌ها قرار می‌گیرد، اما برخلاف تصور عمومی، همیشه بی‌خطر نیست و در برخی موارد نیاز به تجویز پزشک یا داروساز دارد.»

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ملاتونین هورمونی است که به طور طبیعی در مغز تولید شده و وظیفه تنظیم چرخه خواب و بیداری را بر عهده دارد، افزود: این هورمون در شرایطی مانند بی‌خوابی، پرواز زدگی یا اختلال ساعت زیستی در سفر و تغییرات شیفت کاری می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دکتر یوسفی هشدار داد که مصرف کوتاه مدت ملاتونین در دوزهای پایین معمولاً بی‌خطر است، اما استفاده خودسرانه یا طولانی مدت آن می‌تواند عوارضی مانند سردرد، سرگیجه، خواب‌آلودگی مفرط، تغییرات خلق و خو و حتی اختلال در تولید طبیعی ملاتونین در بدن را به همراه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به مطالعاتی در مورد مصرف طولانی مدت ملاتونین بدون نظارت تخصصی که می تواند بر هورمون های مرتبط با باروری و سیستم ایمنی تأثیر بگذارد، گفت: افرادی که بارداری یا شیرده هستند یا بیماری های زمینه ای مانند دیابت، فشار خون بالا و اختلالات ایمنی دارند، حتماً قبل از مصرف ملاتونین یا هر مکمل دیگری با پزشک یا داروساز مشورت کنند.

زنان سیگاری زودتر یا ئسه می شوند

بهمن 10، 1403



کیا پرس/عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: مصرف سیگار و مواد دخانی، میزان باروری زنان را کاهش می دهد و بر روی عملکرد تخمک ها تأثیرات منفی دارد ، علاوه براین مصرف دخانیات در طی بارداری می تواند تأثیرات منفی زیادی بر سلامت جنین داشته باشد.

به گزارش کیا پرس از وبدا، دکتر سلمه دادگر با اشاره به اینکه زنان مصرف کننده سیگار تقریباً دو سال زودتر از سایر زنان یا ئسه می شوند، خاطر نشان کرد: همچنین زنانی که به شکلی در معرض تنفس دود سیگار قرار گرفته اند به طور متوسط ۱۳ ماه زودتر از سایر زنانی که دود سیگار را در محیط زندگیشان استنشاق نکرده اند، یا ئسه می شوند.

وی با بیان اینکه سموم موجود در تنباکو، در مسیر تولید هورمون های مرتبط با چرخه باروری مداخله کرده و می توانند منجر به اختلال در تخمک گذاری شوند، تصریح کرد: این سموم همچنین می توانند پیش از لانه گزینی جنین در دیواره رحم، آسیب زا باشند و بر روی فرآیندهای آماده سازی رحم برای بارداری اثر بگذارند.

وی بیان کرد: عوارض مصرف سیگار در مادران باردار، مرده زایی، جدا شدن زود هنگام جفت و جفت سر راهی است که می تواند برای مادران مصرف کننده دخانیات، مخاطراتی را ایجاد کند.

دکتر دادگر گفت: ترک مصرف سیگار برای بانوان به خصوص در دوران بارداری موجب کاهش عوارض دوران بارداری و بعد از تولد نوزاد می شود.

کرم های انگلی رشد کودکان را مختل می کند

بهمن 10، 1403



کیا پرس/فوق تخصص گوارش، کبد و اندوسکوپی کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه کرم های انگل می تواند در هر سنی فرد را به این بیماری مبتلا کند، گفت: این بیماری در کودکان شایع تر و با مشکلاتی مثل سوء جذب یا اختلال در رشد همراه است.

به گزارش کیا پرس از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر امیرحسین حسینی با اشاره به اینکه بیماری های انگلی از جمله مشکلات نسبتا شایع تر در کودکان است، اظهار کرد: این بیماری نشانه هایی را

به دنبال دارد و در مواردی هم می‌تواند بدون علامت باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین نشانه ابتلا به بیماری‌های انگلی، عدم یا کاهش وزن‌گیری در کودکان مبتلاست.

دردهای مبهم شکمی از دیگر نشانه‌های ابتلا به انگل در کودکان است که این عضو هیئت علمی دانشگاه به آن اشاره کرد و گفت: گاهی دندان قروچه هم می‌تواند از علامت‌های ابتلا کودک به بیماری‌های انگلی باشد اما مشخصا هر دندان قروچه‌ای دلیلی برای بیماری انگلی نیست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه به دیگر نشانه‌های ابتلا به بیماری‌های انگلی در کودکان اشاره کرد و ادامه داد: بوی بد دهان، خارش مقعد یا حتی مشاهده انگل در مدفوع به صورت تخمک‌های انگلی، کرم‌هایی در اندازه‌های یک تا دو سانتی‌متری، کیسه‌ای و یا حتی کرم‌های بزرگتر از جمله نشانه‌های واضح ابتلا به بیماری انگلی است.

دکتر حسینی تاکید کرد: نشانه‌های ابتلا به انگل در کودکان بسیار متنوع است، حتی مشکلات تنفسی هم می‌تواند علامت بیماری انگلی باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان اینکه برای تشخیص بیماری‌های انگلی حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کرد افزود: آزمایش مدفوع در آزمایشگاهی که در این زمینه دقت کافی را دارد، مطمئن‌ترین روش برای تشخیص این بیماری است.

دکتر حسینی هشدار داد: اگر فردی در خانواده به انگل مبتلا باشد، باید تمام اعضای خانواده تحت نظر پزشک متخصص درمان شوند.

وی با بیان اینکه درمان بیماری‌های انگلی متفاوت است خاطرنشان کرد: در درمان بیماری‌های انگلی با روش دارو درمانی معمولا دارو در چند مرحله استفاده می‌شود ولی این موضوع باید حتما با نظارت پزشک انجام شود، در برخی مواردی بعضی افراد نیز منع مصرف دارو دارند.

دکتر حسینی درباره سن ابتلا به بیماری‌های انگلی نیز گفت: انگل می‌تواند در هر سنی فرد را به این بیماری مبتلا کند، اما انگل در کودکان این بیماری شایع‌تر و با مشکلاتی مثل سوءجذب یا اختلال در رشد همراه باشد و در سنین بالاتر نیز برای خود و فرد و اطرافیان او مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: به طور مثال افراد یکه در تهیه غذا نقش دارند اگر که عامل بیماری انگلی داشته باشند می‌توانند افراد بسیار زیادی را

در جامعه به این بیماری آلوده کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه مهم‌ترین راه انتقال انگل از طریق دهان است اضافه کرد: رعایت بهداشت دست‌ها و شست‌وشوی مکرر دست‌ها خصوصاً در افرادی که از کودکان مراقبت می‌کنند اهمیت ویژه‌ای دارد.

چگونه از ابتلا به سرطان پروستات پیشگیری کنیم؟

بهمن ۱۰، ۱۴۰۳



کیا پرس/عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان است، کاهش مصرف کربوهیدرات‌ها و غذاهای چرب و عدم استعمال دخانیات را از عوامل پیشگیرنده در بروز این بیماری عنوان کرد.

به گزارش کیا پرس از وبدا، دکتر سلمان سلطانی، متخصص اورولوژی و جراح کلیه، فلوشیپ جراحی پیوند کلیه افزود: پروستات یکی از ارگان‌های داخل لگن مردان است که در سیستم‌های ادراری و تناسلی و باروری نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به شیوع بالای این بیماری بخصوص در سنین کهنسالی گفت: در مردان بالای ۷۵ سال، ریسک ابتلا به سرطان پروستات افزایش می‌یابد اما بیماری در بدن بسیاری از آنها شناسایی نمی‌شوند، البته با آگاهی دادن به مردم می‌توان به تشخیص زودهنگام این بیماری کمک

کرد.

دکتر سلطانی، فاکتورهای سن و سابقه خانوادگی را از عوامل موثر در ابتلا به سرطان پروستات دانست و گفت: در عامل اول با افزایش سن، احتمال ایجاد سرطان پروستات بیشتر می شود؛ بطوری که یک فرد در طول زندگی خود ۱۷ درصد احتمال ابتلا به سرطان پروستات را خواهد داشت. عامل دوم سابقه خانوادگی است؛ به این نحو که اگر فردی در خانواده درجه یک خود سرطان پروستات داشته و درمان شده یا حتی منجر به فوت وی شده، احتمال ابتلا فرد به سرطان پروستات بسیار بیشتر از یک فرد عادی و معمولی است. لذا کسانی که سابقه خانوادگی دارند خیلی زودتر به پزشک مراجعه کنند و تحت بررسی های لازم قرار گیرند.

وی فرآیند ابتلا به سرطان پروستات را، دارای سیری نسبتاً آهسته دانست و گفت: از زمان ایجاد سرطان تا زمانی که در دیگر ارگان های بدن گسترش یابد، معمولاً چندین سال طول می کشد و با توجه به اینکه این بیماری تدریجی و مزمن اتفاق می افتد، در بسیاری مواقع، ممکن است علائمی به وجود آمده باشد اما فرد به آنها توجهی نکند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: سرطان پروستات جزء بیماری هایی است که اگر زود تشخیص داده شود و درمان لازم صورت گیرد، میزان مرگ و میر در آن پایین خواهد بود.

وی با بیان اینکه نحوه زندگی ما در ابتلا به انواع سرطان ها تأثیر دارد افزود: کاهش غذاهای چرب و کربوهیدرات ها و قطع یا کاهش دخانیات در پیشگیری از ابتلا به بیماری سرطان پروستات بسیار مؤثرند.

وی توصیه کرد: افراد برای پیشگیری از ابتلا به سرطان های پروستات و سیستم ادراری، این اقدامات پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند. این نکته هم قابل ذکر است که مواد غذایی از جمله گوجه فرنگی و کدو که عصاره های آنها به صورت دارو و خوراکی وجود دارند، برای افراد بیمار تجویز می شود و نقش مفیدی در پیشگیری از ابتلا به سرطان پروستات دارند.

مصرف دخانیات در دختران ۱۳۳ درصد افزایش یافت

بهمن ۱۰، ۱۴۰۳



کیا پرس/رئیس انجمن پیشگیری از مصرف دخانیات در جلسه ارائه پیشنویس «سند پیشگیری از مصرف دخانیات» از افزایش ۱۳۳ درصدی مصرف دخانیات در بین دختران خبر داد.

به گزارش کیا پرس از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مسجدی در بیست و پنجمین جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه این شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: سالانه حدود ۱۴۰ هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا میشوند و یکسوم این موارد ناشی از استعمال دخانیات است.

در این جلسه بسته پیشگیری فرهنگی اجتماعی از مصرف دخانیات مورد بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر درباره محتوای آن پرداختند. موضوعاتی نظیر نقش خانواده، مدرسه، محیطهای علمی، زیستبومهای اجتماعی، و توجه به گفتمان جهانی در زمینه پیشگیری از دخانیات، از جمله نکات مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین در این جلسه مقرر شد پیشنویس سند پیشگیری از مصرف دخانیات پس از انجام اصلاحات لازم، جهت بررسی و تصویب به صحن شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

پیشنهاد داوطلب شدن شهر پرند به عنوان «شهر سالم»

بهمن 10، 1403



کیا پرس/معاون بهداشت وزارت بهداشت از انعقاد تفاهم نامه‌ای با مدیرعامل شرکت عمران پرند جهت ارتقای سلامت این شهر خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌دهیم که پرند به عنوان «شهر سالم» کاندید شود.

به گزارش کیا پرس از وبدا، دکتر علیرضا ریسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در آیین افتتاح مراکز جدید خدمات جامع سلامت در پرند و افتتاح دو پایگاه اورژانس در این منطقه بیان کرد: از همه افرادی که در راستای محرومیت زدایی منطقه گام برداشته‌اند باید حمایت کرد.

دکتر ریسی خاطر نشان کرد: برای داشتن توسعه متوازن و پایدار باید زیرساخت‌های مناسب از قبیل بیمارستان، مدرسه، بوستان و پمپ بنزین خوب ساخته شود تا بتوانیم نام آن را توسعه بگذاریم.

وی ادامه داد: نقشه توسعه و ارتقای سلامت شهر پرند در راستای توسعه این منطقه به صورت تفاهم نامه ای با مدیرعامل شرکت عمران پرند امضا می‌شود.

دکتر رئیسی مشارکت مردم در اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی و درمانی را بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و بر استفاده از این ظرفیت تاکید کرد.

معاون وزیر بهداشت در پایان بیان کرد: با تکمیل سرانه های درمانی و خدماتی و بهداشتی پیشنهاد می‌دهیم که شهر جدید پرند به عنوان شهر سالم کاندید شود.

دو مرکز خدمات جامع سلامت شهید محمد حسین اسدی لاری در جنوب فاز ۵ و مرکز جامع شهدای سلامت در فاز ۴ پرند و دو پایگاه اورژانس در جنوب فاز ۴ و فاز ۶ روز گذشته با حضور مسئولان کشوری و محلی بهره‌برداری رسید.

آلودگی هوا چه بلایی سرمان می‌آورد؟

بهمن ۱۰، ۱۴۰۳



کیا پرس/رئیس مرکز تحقیقات آلودگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مطالعات متعددی نشان دادند که آلودگی هوا می‌تواند سبب بروز با تشدید طیف وسیعی از بیماری‌ها شود.

به گزارش خبرنگار کیا پرس، دکتر محمد صادق حسنونند با اشاره به اینکه آلودگی هوا اثرات جدی بر سلامت دارد، افزود: این اثرات هم می‌تواند کوتاه مدت و هم بلند مدت باشد.

وی ادامه داد: اثرات کوتاه مدت مانند تشدید حملات آسم، بیماری‌های تنفسی، سردرد، تحریک پوست و چشم و هم می‌تواند سبب اثرات بلند مدت مانند ابتلا به برخی سرطان‌ها، بیماری قلبی - عروقی و دیابت است.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا می تواند سبب مرگ زودرس شود، گفت: مطالعات نشان دادند حدود ۱۹ درصد از ابتلا و مرگ ناشی از سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا است. سرطان ریه یکی از کشنده ترین سرطان ها است.

وی بیان داشت: مطالعات نشان داده حدود ۱۸ درصد از ابتلای به دیابت نوع ۲ ناشی از مواجهه با آلودگی هوا است و همچنین حدود ۱۸ درصد مرگ در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ ناشی از آلودگی هوا است.

وی ادامه داد: مطالعات متعددی نشان داده که آلودگی هوا هم می تواند روی ناباروری اثر بگذارد.

وی اظهارداشت: افراد کمتر از ۵ سال و بالای ۶۵ سال در معرض آسیب هستند. با توجه به پیرشدن جامعه ایرانی، اگر آلودگی هوا به همین روال ادامه یابد، انتظار می رود آسیب پذیری ما در مواجهه با آلودگی هوا بیشتر خواهد شد.

وی افزود: براساس آخرین گزارشات حدود ۸ میلیون مرگ در دنیا منتسب به آلودگی هوا است و دومین عامل مرگ و میر است. در کشور ما هم سالانه بیش از ۵۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا است.

هشدار، افراط در تجویز دارو و آزمایش

بهمن ۱۰، ۱۴۰۳



کیا پرس/مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در تهران میانگین هر نسخه ۱۵ آزمایش است، گفت: استانداری برای آزمایشات هر بیماری پیدا نکردیم اما هر بیماری مانند عفونی، دیابت یا کبدی، آزمایشات معینی دارد.

به گزارش خبرنگار کیا پرس، محمد مهدی ناصحی افزود: در کشور به صورت میانگین ۱۰.۵ قلم آزمایش در هر نسخه وجود دارد.

وی ادامه داد: هر بیماری یک لیست مشخصی از آزمایش را دارد اما در برخی مواقع، بیماران تقاضای لیست بلندبالایی از آزمایش را دارند که کار درست، اصولی و علمی نیست.

وی افزود: یکی از چیزهایی که در کشور ما بیش از حد مصرف می شود یا حداقل در سبد خانوار وارد می شود، دارو است.

وی افزود: میانگین کشوری هر نسخه ۴.۲ قلم دارو است، در استانی ممکن است ۵ قلم دارو و در استان دیگری ممکن است ۳.۵ یا ۳.۶ قلم دارو باشد.

وی با اشاره به اینکه استانداری که در این زمینه وجود دارد بین ۱.۶ تا ۱.۹ قلم دارو است، گفت: ما بیش از ۲ برابر داریم منابع سلامت را دور می ریزیم. این کار علاوه بر اینکه فایده ای ندارد، خیلی از این داروها مضر هستند.

وی افزود: نتایج تحقیقاتی که برای سالمندان در استان تهران انجام دادیم، نشان می دهد خیلی از داروها یا منع مصرف یا تداخل دارویی دارد به عبارتی یا اثربخشی داروها را کم می کند یا سبب آسیب می شوند.

وی به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها اشاره کرد و گفت: این کار سبب مقاومت دارویی می شود و باید از مصرف بی رویه و خودسرانه آن به شدت خودداری کرد.

وی تاکید کرد: این معضل با ارتقا سطح آگاهی مردم کاهش خواهد یافت به عبارتی از دورریز منابع سلامت کاسته خواهد شد.

اوتیسم در سه سال اول زندگی قابل تشخیص است

بهمن 10، 1403



کیا پرس/ دکتر سینا توکلی ؛ دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و معاون آموزش، توانبخشی و سلامت خانواده انجمن اوتیسم ایران، به بررسی ابعاد مختلف این اختلال پرداخت.

به گزارش کیا پرس از روابط عمومی انجمن علمی پزشکان کودکان ایران، سمپوزیوم اختلالات طیف اوتیسم با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه سلامت و روانشناسی برگزار شد.

توکلی در این سمپوزیوم اظهار کرد: «اوتیسم یک اختلال نافذ رشدی است که معمولاً در سه سال اول زندگی قابل تشخیص است. از مهم‌ترین علائم این اختلال می‌توان به نقص در ارتباط و تعاملات اجتماعی و بروز رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای اشاره کرد. کودکان با این اختلال ممکن است در مهارت‌هایی چون ارتباط چشمی، واکنش به اسم خود و لبخند اجتماعی ضعف داشته باشند که این موارد زنگ هشدار برای مراجع به روانپزشک کودک و نوجوان است.»

وی در ادامه افزود: «برخی از کودکان طیف اوتیسم رفتارهایی مانند بال‌بال زدن، بازی با چرخ اسباب‌بازی، چرخیدن بی‌هدف یا راه رفتن روی نوک پنجه از خود نشان می‌دهند. همچنین، این کودکان ممکن است در مهارت‌های ارتباطی، شناختی و درکی-حرکتی چالش‌هایی داشته باشند. برای مثال، اگر کودکی تا دو سالگی کلمه نداشته باشد یا به دستورات ساده پاسخ ندهد، والدین باید حساسیت بیشتری نشان دهند و به متخصص مراجعه کنند.»

آمار و خدمات انجمن اوتیسم ایران

توکل به خدمات و آمارهای انجمن اوتیسم ایران اشاره کرد و گفت: «این انجمن بیش از ۸۵۰۰ عضو در سراسر کشور دارد و خدمات توانبخشی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، رفتاردرمانی، و بازی‌درمانی را به کودکان زیر ۷ سال ارائه می‌دهد. همچنین، ۲۳ دفتر نمایندگی و ۱۰ کلینیک تحت عنوان «خانه‌های امید اوتیسم» در استان‌های مختلف نظیر تهران، سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و لرستان فعالیت می‌کنند.»

وی تأکید کرد: «درمان اصلی اوتیسم توانبخشی و رفتاردرمانی است و تاکنون درمان دارویی قطعی برای این اختلال وجود ندارد. والدین باید از رویکردهایی مانند نوروفیدبک یا درمان‌های گیاهی که توسط برخی افراد سودجو تبلیغ می‌شوند، اجتناب کنند.»

اهمیت مداخلات روانشناختی برای والدین

معاون آموزش، توانبخشی و سلامت خانواده انجمن اوتیسم ایران، با تأکید بر حمایت از والدین کودکان طیف اوتیسم بیان کرد: «شیوع اختلالات اضطراب و افسردگی در میان والدین کودکان اوتیسم بالاست. به همین دلیل، انجمن اوتیسم خدمات روان‌درمانی، مشاوره حقوقی، و آموزش‌های فرزندپروری ویژه را به صورت رایگان ارائه می‌دهد. والدین می‌توانند از طریق سامانه مشاوره تلفنی به شماره ۰۲۱۴۸۰۸۵۰۰۰، از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب، با کارشناسان ارتباط برقرار کنند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «تشخیص به موقع اختلال طیف اوتیسم در سه سال اول زندگی بسیار اهمیت دارد. مداخلات زودهنگام می‌تواند در بهبود کارکردهای حرکتی، زبانی، شناختی، و رفتاری کودکان تأثیر چشمگیری داشته باشد.»

پایان خبر